


<https://www.deuka.de/aktuelles/koliken-bei-pferden/>

**Besonderheiten der Pferdefütterung bei Magen-Darm-Problemen**



# KOLIKEN BEI PFERDEN: WIE BEUGE ICH IM WINTER VOR?

Der Alltag vieler Pferde gestaltet sich während der Wintermonate anders als im Sommer. Durch reduzierte Weidegänge und Bewegung kann es zu Koliken kommen. Bemerken Pferdehalter\*innen Veränderungen an ihrem Tier, ist daher erhöhte Aufmerksamkeit geboten. Schließlich können Koliken mitunter lebensbedrohliche Verläufe nehmen. Hier erfährst du, was du tun kannst, um einem Magen-Darm-Leiden deines Pferdes bestmöglich vorzubeugen. Solltest du jedoch bereits erste Anzeichen bemerken – oder unsicher sein – ziehe direkt eine\*n Tiermediziner\*in zurate.

Unter Pferdehalter\*innen wird der Begriff „**Kolik**“ (lat. c<sup>o</sup>l<sup>i</sup>cus) meist gleichbedeutend mit allgemeinem Unwohlsein oder Schmerzen im Bauchraum der Pferde verwendet. Beides kann durch **viele unterschiedliche Faktoren verursacht** werden. Je nach Ursprungsort unterteilt man Koliken in verschiedene Gruppen.

## Die verschiedenen Arten einer Kolik

### Verstopfungskolik im Dickdarm

Der Darminhalt des Pferdes wird durch fehlende Flüssigkeit zu fest und das **Tier kann ihn nicht mehr ausscheiden**. Gründe für den Flüssigkeitsmangel gibt es viele: Eine zu geringe Wasseraufnahme, zu viel Stroh oder schlecht gekautes Futter sind die häufigsten Gründe.

### Verstopfungskolik im Dünndarm

Hier liegt der Ursprung der Verstopfung weiter vorne im Darm. Geschwülste oder Gekröse an der Darmwand können die Auslöser sein. Aber auch ein starker Befall mit parasitären Würmern kann die Verstopfung im Dünndarm verursachen.

### Sandkolik

Die Sandkolik wird von **Ablagerungen in Magen und Darm** (z. B. Sand, Steinchen) ausgelöst, die zu einer

operationsbedürftigen Verdrehung des Dickdarms führen. Als weitere Folge der Sandkolik kann es zur **Darmdrehung** kommen. Eine Darmdrehung wird oft durch Fehlgärungen verursacht. Grund hierfür: Sand, schlechtes Futter oder eine zu abrupte Futterumstellung.

## Gaskolik

Entstehen durch **blähende Futtermittel** (z. B. frisch gemähtes Gras oder Mais). Die Gaskolik äußert sich durch vermehrte Blähungen und äußerlich durch einen meist vergrößerten, „aufgeblähten“ Bauch.

## Krampfkolik

Die Krampfkolik ist durch (starke) **Krämpfe der Magen-Darm-Region gekennzeichnet**, deren Ursache größtenteils bei Fütterungsfehlern oder Stress zu suchen ist. Auch ein Parasitenbefall (z. B. Bandwürmer) kann die Krämpfe hervorrufen.

## Magenüberladung

Man unterscheidet zwischen einer **primären** und einer **sekundären Magenüberladung**. Eine primäre Überladung liegt dann vor, wenn das Pferd zu viel quellendes und/oder gärendes Futter gefressen hat. Von einer sekundären Überladung spricht man, wenn sich – z. B. aufgrund eines Darmverschlusses – Speichel, Futterreste und Sekrete in den Magen zurückstauen.

## Darmverschluss

Arbeitet die Darmmuskulatur nicht mehr oder nicht in ausreichendem Maße, verkrampft sich der Verdauungskanal. In extremen Fällen kann ein vollständiger und mitunter lebensbedrohlicher Darmverschluss die Folge sein.

## Darmeinklemmung

Hierbei handelt es sich um eine eher seltene Form der Kolik. Dabei schiebt sich der Darm durch kleinere Lücken in der Muskulatur oder der Bauchhöhle, verklemmt sich und kann nicht mehr in seine ursprüngliche Position zurück.



Ein Pferd mit Magenproblemen liegt im Schnee (© Nadine Haase – stock.adobe.com)

## Mögliche Symptome einer Kolik

Ob die Situation für das Pferd lebensbedrohlich ist, oder es sich lediglich um eine Magen-Darm-Verstimmung handelt, ist von der Ursache und dem Verlauf abhängig. **Schwer verlaufende Koliken sind in jedem Fall ernst zu nehmen.** Pferdehalter\*innen tun deshalb gut daran, das Verhalten ihrer Lieblinge genau zu beobachten und im Zweifelsfall **umgehend tierärztlichen Rat einzuholen.**

Da einer Kolik verschiedene Ursachen zugrundeliegen, unterscheiden sich auch die Symptome von Fall zu Fall. Allerdings treten in der Praxis einige Krankheitszeichen besonders häufig auf. Das sind bspw.:

- **Unruhe**
- Vermehrtes **Scharren**
- Wiederholtes **Flehmen**
- **Ausschlagen** des Kopfes gegen Rücken oder Bauch
- Häufiges **Hinlegen**, wiederholtes **Wälzen**
- **Weit aufgerissene Augen**
- **Stoßatmung**
- **Trockene Mundschleimhaut**
- **Schweißausbrüche, kalter Schweiß**
- **Verweigerung der Wasser- und Futteraufnahme.**

## Ursachen von Koliken und Magen-Darm-Problemen im Winter

Die Lebensumstände der Pferde im Winter können einige Magen-Darm-Erkrankungen begünstigen:

- Während der langen, dunklen Tage in den Boxen wird es Pferden häufig langweilig. Um sich zu

beschäftigen, kann es vorkommen, dass sie **mehr Stroh als üblich fressen**. Die rohfaserreichen Getreidehalme enthalten viel Lignin. Dieser stabile Pflanzenbestandteil ist nur schwer verdaulich und sorgt in großen Mengen für eine sehr träge Verdauung.

- Speziell im Winter trinken Pferde oft **zu wenig Wasser**. Gerade kaltes Tränkwasser wird weniger angerührt. Steht das Tier zudem längere Zeit auf Paddocks ohne Tränke, verstärkt auch das einen Wassermangel. Zusammen mit übermäßiger Strohaufnahme wird so der Grundstein einer Verstopfungskolik gelegt.
- Der **Bewegungsmangel**, der im Winter schneller vorkommen kann als in Frühling oder Sommer, wirkt einer gesunden Aktivität von Magen und Darm entgegen. Schließlich fördert eine regelmäßige und kontinuierliche Bewegung Stoffwechsel und Verdauung. Bleiben Ausritte und Weidegänge aus, kann es sein, dass sich der Stoffwechsel verlangsamt und die Darmaktivität abnimmt. Verdauungsstörungen können so besonders leicht auftreten.
- Im Winter stehen Pferde öfter auf den feuchten Paddocks. Hier können sie **Steinchen, Sand und Schlamm** aufnehmen. Wenn sie kurze Grashalme aus dem Sand ziehen, nehmen sie stets Sand mit auf. Aber auch beim Plantschen im Schlamm und Saufen des Schlammwassers gelangt einiges an Dreck ins Pferd. Lagern sich die Schmutzpartikel anschließend in Magen und Darm ab, bilden sie den Ausgangspunkt einer Sandkolik.

## Diese 11 Tipps helfen einer Kolik vorzubeugen

### 1. Auf ausreichend Bewegung achten

Egal, ob es regnet, stürmt oder schneit: **Bewegung tut immer gut**. Gerade im Winter sollten Pferdehalter\*innen für zusätzliche Bewegungseinheiten sorgen. Das **kurbelt** nicht nur die **Verdauung an**, sondern **stärkt** zugleich das **Immunsystem**.

### 2. Für ausreichend Wasser sorgen

Neben der Reduzierung der Strohaufnahme ist eine **ausreichend Flüssigkeitsversorgung wichtig**, um die Verdauung in Gang zu halten. Rühren Pferde das Wasser bei frostigen Temperaturen nicht an, macht es Sinn, **angewärmtes Wasser zuzugeben**. Das kontrollieren der Tränken ist sehr wichtig. Auch eine zwei- bis dreimal wöchentliche Fütterung mit Mash (z. B. deukavallo Apfelmash) kann helfen, für mehr Flüssigkeit zu sorgen.

### 3. Genügend Heu bereitstellen

Sie sollten Ihren Pferden stets **Heu oder Heulage in ausreichender Menge** zur freien Verfügung anbieten. Dabei ist immer auf eine **gute Qualität zu achten**.

## 4. Heuergänzer gegen übermäßige Strohaufnahme

**Frisches Heu und Heulage** in guter Qualität sind das A und O einer guten Verdauung. Ist hiervon genügend vorhanden, kann dies auch den übermäßigen Verzehr von Stroh im Winter unterbinden. Ist nicht genügend Heu vorhanden oder möchten Pferdehalter\*innen die Menge zusätzlich aufstocken, eignet sich ein **Heuergänzer** (z. B. deukavallo Heucobs). Der Raufutteranteil sollte insgesamt ~1,5 kg je 100 kg Körpergewicht betragen.

## 5. Zwei Kilo pro Mahlzeit nicht überschreiten

Gerade bei Pferden mit empfindlichem Magen sollte Kraftfutter auf **mehrere kleinere Mahlzeiten aufgeteilt** werden. Auch lassen sich mehrere kleine Portionen schonender verdauen als wenige große. Schließlich hat es sich bewährt, Pelletfutter (z. B. deukavallo Top E) mit einem gewissen Abstand nach der Heuaufnahme anzubieten (ca. 15 Minuten).

## 6. Die Fütterung auf Paddocks überdenken

In den nassen und matschigen Paddocks besteht die Gefahr, dass die Vierbeiner Sand, Schlamm, Steinchen oder Dreck mit dem Heu bzw. der Heulage aufnehmen. Bei einem Aufenthalt von bis zu einer Stunde tut man gut daran, dort auf die Zufütterung zu verzichten. Sollen die Tiere gar mehr als eine Stunde auf den Paddocks verbringen, sollten Sie ihnen das **Futter in Heuraufen anbieten**. So bleibt das Futter stets sauber. Achten Sie dabei auch darauf, dass die Umgebung der Raufe sandfrei bleibt. Wenn die Raufe leer ist, fressen die Tiere auch vom Boden. Gerade rangniedrigeren Tieren bleibt oft nichts anderes übrig.

## 7. Floh- und Leinsamen gegen Dreck im Futter

Floh- und Leinsamen besitzen **sandbindende Eigenschaften**. Lässt sich nicht verhindern, dass die Pferde Sand, Steine oder Schmutz mit Futter oder Wasser aufnehmen, können Pferdehalter\*innen z. B. mit Fütterung von Flohsamen oder Leinsamen einiges an Sand wieder aus dem Magen und Darmtrakt herausbekommen (z. B. deukavallo Leinvital).

## 8. Kräuter wirken vitalisierend

Zusätzlich können Kräuter im Futter **anregend** und **vitalisierend wirken**. Hier eignen sich Pferdefutter mit entsprechenden Kräutermischungen (z. B. deukavallo Kräutermüsli). So regen Sie den Stoffwechsel Ihrer Tiere an und unterstützen die Ausbildung eines starken Immunsystems. Manche Kräuter besitzen zudem **krampflösende** und **schmerzlindernde Eigenschaften**.

## 9. Mineralfutter ersetzen im Winter frische Gräser und Weidepflanzen

Vitamine und Mineralstoffe sind gerade in der **dunklen Jahreszeit besonders wichtig**. Doch gerade jetzt stehen weder frisches Gras noch Weidepflanzen ausreichend zur Verfügung. Durch das Fehlen der Sonne kann zudem meist kein **Vitamin D** gebildet werden. **Mineralfutter** (z. B. deukavallo Mineral) eignet sich gerade jetzt gut, die Zeit bis zur Weidesaison zu überbrücken.

## 10. Die Fütterung nur langsam umstellen

Abrupte Umstellungen der Fütterung können Magen und Darm belasten. Sollte ein Wechsel der Fütterung anstehen, sollten Pferdehalter\*innen darauf achten, nur **langsam** und **in kleinen Schritten** auf ein neues Futter **umzustellen**.

## 11. Einstreu wechseln

Frisst das Pferd aus Langeweile übermäßig Stroh, sollten Pferdehalter\*innen über den **Wechsel der Einstreu** nachdenken. Als Alternativen eignen sich zum Beispiel **Leinstroh, Holzspäne oder Strohhäcksel**. Darüber gestreut genügen dann ca. 0,5 kg Stroh je 100 kg Körpergewicht an frischem Stroh.

*Bildnachweise: © 135pixels – stock.adobe.com (Top-Slider) / © Nadine Haase – stock.adobe.com*

## Ansprechpartner



### Barbara Wefers

**Teamleitung Produktmanagement Hobbyfarming**

E-Mail: [barbara.wefers@deutsche-tiernahrung.de](mailto:barbara.wefers@deutsche-tiernahrung.de)

Tel.: +49 (0)211 / 3034 - 429