

# ALL-MASH R

## Junghennenaufzucht bis zum Beginn der Legetätigkeit

- deuka all-mash R ist ein Reifefutter zur Junghennenfütterung ab der 8. Lebenswoche bis zum Beginn der Legetätigkeit.
- Es wird im Anschluss an die Kükenfütterung (siehe all-mash A) eingesetzt und bereitet die Junghennen optimal auf die Legetätigkeit vor indem das Wachstum der Hennen entschleunigt wird und die Legeorgane Zeit haben, sich zu entwickeln.
- Je nach Vorliebe oder Art des bereits eingesetzten Kükenfutters ist es in Mehlforn oder als Pellet = gekörnt erhältlich.
- Dabei ist die Mehlforn wahlweise mit oder ohne Kokzidiostatikum zum Schutz vor Darmkokzidiose verfügbar.

**Tipp:** Alle Futterartikel bei deuka die mit all-mash beginnen sind Alleinfutter und versorgen Ihre Tiere mit allen notwendigen Nährstoffen.



## Inhaltsstoffe

### all-mash R m. Cocc.:

Rohprotein	14,50 %
Rohfett	3,70 %
Rohfaser	4,00 %
Rohasche	5,70 %
Lysin	0,60 %
Methionin	0,30 %
Calcium	0,90 %
Phosphor	0,50 %
Natrium	0,16 %
Energie	11,4 MJ ME/kg

*Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.*

## Zutatenliste

### all-mash R:

Weizen, Mais, Sonnenblumenextr.schrotfutte, Rapsextr.schrotfutter, Sojasextr.schrotfutter (dampfherh.),

Calciumcarbonat, Weizengrießkleie, ZR-Melasse, Pflanzenfettsäuren, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat

*Je nach Produktionswerk, Jahreszeit, Warenverfügbarkeit u.a. können leichte Veränderung der Zusammensetzungen möglich sein. Die tatsächliche Rezeptur und Inhaltstoffe des Futters finden Sie auf der Deklaration, die auf jedem Futtersack angebracht ist.*

## Vitamine

Vitamin A	9.000,00 I.E./kg
Vitamin D <sub>3</sub>	2.250,00 I.E./kg
Vitamin E	23,00 mg/kg

*Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.*

## Spurenelemente

+ weitere Spurenelemente enthalten

*Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.*

## Fütterungsempfehlung

Als Alleinfutter für Junghennen von der 8. Lebenswoche bis zwei Wochen vor der Legereife füttern.

Stets für frisches Trinkwasser sorgen.