

VOMIGO

Legehennen-Alleinfutter - Wenn die rote Vogelmilbe im Stall ist

- Club VoMiGo ist ein Alleinfutter für Legehennen ab der Legereife.
- Die ausgewogene Zusammensetzung versorgt Ihre Hühner mit allen Nährstoffen, die sie für eine zuverlässige Legetätigkeit benötigen.
- VoMiGo enthält Aromastoffe aus Pflanzenextrakten. Diesen Geruch mag die rote Vogelmilbe nicht.
- Die Aromen haben keinen Einfluss auf den Geschmack oder Geruch der Eier oder des Fleisches.

Bitte beachten Sie, dass die Produkte unserer Marke Club lediglich bei bestimmten Händlern - vor allem im süddeutschen Raum - erhältlich sind. Erkennbar ist das in der Händlersuche an dem Club Markenlogo.



Inhaltsstoffe

Rohprotein	17,00 %
Rohfett	3,90 %
Rohfaser	2,90 %
Rohasche	12,50 %
Lysin	0,74 %
Methionin	0,37 %
Calcium	3,60 %
Phosphor	0,50 %
Natrium	0,16 %
Energie	11,20 MJ ME/kg

Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.

Zutatenliste

Weizen, Mais, Sojaextr.schrotfutter (dampferh.), Calciumcarbonat, Sojaöl, Monocalciumphosphat, Pflanzenfettsäuren, Natriumchlorid, Na-Carbonat,

Je nach Produktionswerk, Jahreszeit, Warenverfügbarkeit u.a. können leichte Veränderung der Zusammensetzungen möglich sein. Die tatsächliche Rezeptur und Inhaltsstoffe des Futters finden Sie auf der

deuka

Deklaration, die auf jedem Futtersack angebracht ist.

Vitamine

Vitamin A	9.000,00 I.E./kg
Vitamin D ₃	2.500,00,00 I.E./kg
Vitamin E	20,00 mg/kg

Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.

Spurenelemente

+ weitere Spurenelemente enthalten

Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.

Fütterungsempfehlung

Als Alleinfutter für Legehennen zur freien Verfügung zwei Wochen vor Beginn der Legereife und während der Legeperiode füttern. Der Tagesbedarf für eine moderne Legehenne (Hybride mit ca. 1,5 kg Körpergewicht) liegt bei ca. 120 Gramm pro Tier und Tag.

Stets für frisches Trinkwasser sorgen.

Beachten: Das Futter ist ein Alleinfutter. Eine zu hohe Beifütterung von zum Beispiel Speiseresten sollte nicht erfolgen.